

## 今年首例本土登革熱現蹤，籲請民眾落實防蚊滅蚊，醫療院所加強通報 107.07.02



疾病管制署公布國內今(2018)年首例本土登革熱確定病例，高雄市前鎮區 30 多歲男性 6 月 28 日出現發燒、頭痛、食慾不振等症狀至診所就醫，因症狀持續且出現肌肉痠痛情形分別於 29、30 日兩度就醫，經通報檢驗確診感染登革病毒第三型，目前個案住院防蚊隔離中。

疾管署表示，個案潛伏期間無國外旅遊史，平時活動地以住家及工作地為主，研判為本土感染，同住接觸者目前均無疑似症狀。為避免疫情傳播，地方政府已成立區級指揮中心，持續針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除及衛教等防治工作。

今年截至 7 月 1 日國內共計 1 例登革熱本土病例；另有 94 例境外移入病例，境外移入病例數為 2013 年至 2018 年同期次低；近一個月境外移入病例感染國家以柬埔寨、菲律賓及泰國等東南亞國家為多。去(2017)年國內共 10 例本土病例，333 例境外移入病例。近期泰國、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡登革熱疫情上升，馬來西亞疫情略降，其中泰國今年累計病例數約 2 萬 2 千例，較去年同期增加逾 48%，其他東南亞國家及中國大陸尚處低水平。

登革熱潛伏期約 3 至 8 天，最長可達 14 天，有些人感染後症狀輕微，甚至不會出現症狀。典型感染症狀包括突發性高燒(≥38°C)、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，患者發病後第 3 至 5 天，如出現劇烈疼痛、抽搐、昏迷、意識狀況及血壓改變等情形，須注意是否為登革熱重症。

時序入夏各地氣溫偏高，近期中南部地區受西南風影響仍有降雨機會，環境積水容器易助長病媒蚊孳生，籲請民眾雨後應落實戶內、外環境整頓、巡查及孳生源清除。此外，適逢暑假期間，民眾如計劃前往登革熱流行地區應作好防蚊，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等；返國後如出現疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊活動史。醫療院所如遇有疑似感染個案請及早通報，以利衛生單位採取防治措施。相關資訊可至疾管署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)或撥打免付費防疫專線 1922 (或 0800-001922) 洽詢。